

チビシモ[®] CHIBISHIMO

凍傷用軟膏

第二類醫藥品



對凍瘡和搔癢非常有效，改善血液循環，讓肌膚恢復到正常的狀態。小孩到夫人都適用的溫感型軟膏。

MADE IN JAPAN

功用

凍瘡、搔癢、濕疹、皮膚炎

用法、用量

請 1 天數次適量地塗擦在患部。

用法、用量相關的注意事項

- (1) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (2) 請勿在手上沾有軟膏時，觸碰眼睛或嘴巴周圍等。
- (3) 請注意不要接觸眼睛。萬一進入眼睛時，請迅速以清水或溫水沖洗。另外，當症狀嚴重時，請接受眼科醫生的診療。
- (4) 請僅用於外部。

成分、分量（100g 中）與作用

成分	含量	作用
鹽酸苯海拉明	2.0g	抑制組織胺的作用，確實控制搔癢的情況產生。
利多卡因	2.0g	藉由局部麻醉作用，迅速舒緩搔癢。
甘草酸	0.5g	控制凍瘡、濕疹等炎症。
醋酸鹽維他命E	0.1g	擴張末梢血管以改善患部的血液循環。

作為添加物，含有聚乙二醇、聚山梨醇酯 80。

※本藥劑不含類固醇成分。

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

1. 請勿用於以下部位。
眼周、黏膜等

諮詢事項

1. 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
 - (1) 正在接受醫師治療的人
 - (2) 曾因藥物等引起過敏反應的人
 - (3) 濕潤、糜爛嚴重的人

2. 使用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢、腫脹

3. 使用約 5 ~ 6 天症狀仍未好轉時請停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。