

健のう丸[®]

KENNOGAN



便秘薬 < 原料药制剂 >

指定第二类医药品

丸剂型便秘药，仅使用植物成分制成。

1天1次就寝前服用，次日（通常8～12小时后）能实现接近自然的舒适排便。

MADE IN JAPAN

功效

缓解便秘及因其引起的以下症状：

头重、潮热、肤质粗糙、厌食、食欲不振（食欲减退）、腹胀、肠道异常发酵、痔疮

用法用量

请遵守以下用量，1天1次，睡前服用。

但是便秘症状因人而异，因此初次请服用最小药量，观察排便的情况和状态同时酌情增量或减量。

	15岁以上	11岁以上，未满15岁	7岁以上，未满11岁
2～3天没有排便时	6～9粒	4～6粒	3～4粒
4天以上（含）没有排便时	9～12粒	6～8粒	4～6粒

关于用法用量的注意事项

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 儿童应在监护人的指导监督下服用

成分、分量（12粒中）及作用

成分	分量	作用
大黄粉末	640mg	促进大肠的正常运动。
芦荟粉末	160mg	
番泻甙钙盐	24mg	

含有的添加剂：阿拉伯树胶、糊精、聚乙二醇。

关于成分及分量的注意事项

- (1) 服用本药可能使尿液变成棕黄色或红褐色，但这是因有效成分番泻苷引起，并非异常。
- (2) 本药使用天然原料，产品的色调及光泽存在差异，但效果不受影响。

使用上的注意事项

禁止

（如果不遵守，将导致目前的症状恶化或易发生副作用）

1. 服用本药的期间内，请勿服用以下医药品。
其他泻药
2. 哺乳期的患者请勿服用本药，如果服用本药请勿哺乳。
3. 请勿大量服用。

咨询

1. 以下患者使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。

- (1) 正接受医生治疗的患者
- (2) 怀孕或可能已怀孕的患者
- (3) 曾因药物等引发过敏症状的患者
- (4) 存在以下症状的患者

剧烈腹痛、恶心、呕吐

2. 服用后如有以下症状，可能是发生了副作用，因此请立即停止服用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒
消化系统	剧烈腹痛、恶心、呕吐

3. 服用后可能出现以下症状，此类症状持续或有恶化的迹象时，请停止服用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。

4. 如果服用约 1 周后症状仍无改善，请停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。