



新今治水®

NEW KONJISUI

牙痛止痛剂

第二类医药品

液剂型牙痛止痛药，直接涂于牙齿的痛处，迅速止痛。

MADE IN JAPAN

功效

消除蛀牙、松动的牙齿、牙根的疼痛。

用法用量

请将浸有药剂的棉球塞入蛀牙的牙洞内。

取下顶盖，内有棉花。请用干净的手指分出适当大小的棉球后使用。



请用附带的镊子让棉球流出适量的新今治水。



蛀牙出现大洞并且疼痛时，请将浸过新今治水的棉球塞入牙洞内。

蛀牙出现小洞并且疼痛时，请用棉球浸入新今治水，涂在蛀牙的表面。

关于用法用量的注意事项

- (1) 请遵守规定的用法。
- (2) 请勿涂到疼痛中的牙洞以外的位置。
- (3) 儿童应在监护人的指导监督下使用。
- (4) 本药限用于牙科，请勿用于眼科及其他用途。
- (5) 本药不会损伤牙齿的硬牙质（牙釉质 / 牙本质），但如果多余地沾到牙齿以外的位置，短时间内可能会影响进餐时的口感，因此请使用纱布等将多余的部分擦除。
- (6) 如果不小心沾到嘴巴周边或脸部，请立即用水冲洗干净后擦除。

※本药无法根除蛀牙等引发的牙痛的原因，因此建议您尽快去看牙医以求根治。

成分、分量（100g 中）及作用

成分	含量	作用
丁香油	0.3g	止痛。
苯酚	5.0g	止痛杀菌。
dL-樟脑	10.0g	止痛。
肉桂油	2.5g	
I-薄荷醇	0.1g	
盐酸苯海拉明	2.0g	抑制炎症。

盐酸地布卡因	0.1g	止痛。
p-butylaminobenzoyl diethylaminoethanol hydrochloride (盐酸丁卡因)	0.03g	
梔子酊剂	15.07g	抑制炎症。

含有的添加剂：丙二醇、乙醇。

使用上的注意事项

禁止

(如果不遵守，将导致目前的症状恶化或易发生副作用)

请勿用于以下部位。

牙龈、嘴唇

咨询

- 以下患者使用前请咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商。
 - 正接受医生或牙医治疗的患者。
 - 曾因药物等引发过敏症状的患者。
- 使用后如有以下症状，可能是发生了副作用，因此请立即停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒

- 如果使用 5 ~ 6 次后症状仍无改善，请停止使用，并带上本文件咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商。