

無臭性

アスタ[®]-G軟膏

Astha G



脚癬及頑癬治療薬

第二类医薬品

本款软膏以托萘酯作为主要成分，无味，刺激性小。可抑制癣菌生长，同时多种止痒成分能迅速平息瘙痒，对腹股沟癣、脚癣和体癣等也具有很好的效果。

MADE IN JAPAN

功效

腹股沟癣、脚癣、体癣

※本药不能用于阴囊部位的疾病，如有需要，请咨询医生、药剂师或注册销售商。

用法用量

1 天数次涂于患处。

· 患处产生水泡时，不可强行弄破，涂在水泡上也能获得充分的效果。

关于用法用量的注意事项

- (1) 请清洁患处及其周边后方可使用。
- (2) 请注意避免进入眼睛。万一进入眼睛时，请立即用水或温水清洗，并立即接受眼科医生诊疗。
- (3) 儿童应在监护人的指导监督下使用。
- (4) 本药仅限外用。

成分、分量（100g 中）及作用

成分	含量	作用
托萘酯	2.0g	对引起腹股沟癣、脚癣的致病菌具有极强的抗菌作用。防止细菌引起化脓。
氧化锌	5.0g	吸附分泌物，使患处干燥并促进治疗。缓解患处的炎症。
I-薄荷醇	2.0g	平息令人不适的瘙痒和疼痛。
盐酸苯海拉明	1.0g	
利多卡因	0.5g	
异丙基甲基苯酚	0.3g	防止细菌引起化脓。
甘草次酸	0.25g	缓解患处的炎症。

含有的添加剂：液体石蜡、凡士林、石蜡、硬脂醇、甘油、山梨坦硬脂酸酯、角鲨烷、硬脂酸、聚氧乙烯氢化蓖麻油、胆固醇、对羟基苯甲酸丁酯。

使用上的注意事项

禁止

(如果不遵守，将导致目前的症状恶化或易发生副作用)

请勿用于以下部位。

- (1) 眼睛及眼部周边、粘膜（例如：口腔、鼻腔、肛门等）、阴囊、外阴部等
- (2) 湿疹
- (3) 潮湿、糜烂、破裂或外伤严重的患处

咨询

1. 以下患者使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。
 - (1) 正接受医生治疗的患者。
 - (2) 婴幼儿
 - (3) 曾因药物等引发过敏症状的患者
 - (4) 患处位于脸部或患处范围大的患者
 - (5) 患处已化脓的患者
 - (6) 不清楚是“湿疹”还是“腹股沟癣、脚癣、体癣”的患者
(阴囊如有瘙痒、糜烂等症状，往往是由于湿疹等其他原因引发)
2. 使用后如有以下症状，可能是发生了副作用，因此请立即停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒、炎症、肿胀、刺激感

3. 如果使用约 2 周后症状仍无改善，请停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。